Kichmich noir

Vass7R09s561-565

Wtp582

OMtp582

Collection Vassal-Montpellier

Kichmich moin 10 R94-356-360







doctordoctordoctordoctoral



uluutuuluutuuluutuuluutuul

ANNEE 1992

Kichmich in EMPLACEMENT 10 R 9 1 356-360

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	f f f 6 4	-16 3	13 3 ×	0	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	: G - G - G - G - G - G - G - G - G - G	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov- Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	Compa yl-fus : inc	cité:	L - M -C
	arraphor as											

ANNEE: 1993

NOM Kichmichnoir

EMPLACEMENT 10R94.356.360

8	27.8.	9	m											
uche	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	fin	Véraison début mi/v fin			Maturité			
1	5	163	18.3×	. 0										
3	4	163	18.31	0										
4	4	22,3	18.31 25.3* 16.3×	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :									
5	2	113	16.3~	0	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb									
	D	le 18.	3,93											
		<i>−2</i> ,			Pépins Port :	: avec	c - apy	yrène <u>Vi</u>	gueur	: 3, 5	5			
						2)								

ANNEE: 1994

NOM Kichmich noir EMPLACEMENT 10 R9 1 356-360

duntadantadantadantad

8.27.89 mi

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti-	Flo: début		Véraison début mi/v fin			Maturité				
1	3	3.3	734	0	TL2 TC2	22,5	96,5	30,5				£2.8 +2			
3	4	73	10.3×	2	Grappe	: G(
TL4	9	73	10.34	2	Grappe: G - M - P Dim: 18 Compacité: L - M-C Pour: Mill: 0 C Baie: TC - Dim: 18 (16 disc-sph(ell)-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb										
5	3	3,3	7,3 *	0											
) le	7.3.9	4 en TC	(0)											
			4 on Th	_(+3)	Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :										

	NOM Kechnech non EMPLACEMENT 10 R 9 x 356 - 360												
Souche	Nbre yeux	Débot	mi/déb			Flo: debut	raison mi/f		Véraison fin début mi/v fin Matu				
1 & 2 & 3 A 5 5	1 2	Exp	AB	000	Pour : Baie : Couleu	TC - Cdisc-spr : B-C : s - control : ayec	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	1: - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: Dov-cyl Dox - he	-fus inc -		: L - M- C	

Kichmich moin 10 R90-356,360s.3

N° d'ordre :

luntum mutu

Désignation :

dantadantadantadantad

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188) - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8)- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 1/98.)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 / séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.)

A pétiole glabre 2/34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

Nº d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kichmich non 10 R91.356,360 A13

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entierement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. Kichmich non 10 R95-356,360A,5

N° d'ordre : Désignation :

Lundandanda

dantanlaataalaataalaataal

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150/- séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 169 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161).

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen [71] - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Calro 91

N° d'ordre : Désignation : Kichmich non 10 R90-356,360 A-3

dantadantadantadantad

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne (9) - Petite 70 (dimensions: x).

Lâche (11) - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77) mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 17).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - pen apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 /- non déprimée 111.

A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (29).

A pinceau : court 130 - moyen 181 - long 132.

A pinceau : coloré 133 mon coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 168 - juteuse 169 - molle 169 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 94

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Kichmich mon 10 R 9 s - 356.360 s - 4

dantadantadantadantad

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2))

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

> : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91

d'ordre : Kichmich moir mplacement : 10 R g A 356.360

Juntumlanda Juntumlanda

```
: 1 - 2 - 3
Ingle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : (7-(8-9)
61/1
                                 : (10 - (11)
62/L
                                 : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                 : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                 : (27)
                                  : 40 - 41
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                 : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                 : 60 - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                  : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 93